


Elevage allaitant : les traitements adaptés pour maîtriser le parasitisme

Pâturage de broutards nés en été-automne

Parcelles pâturées au printemps et en été, avec ou sans agrandissement




Traitements préconisés contre les strongles

- W** **Produit à action immédiate** : un seul traitement des génisses à l'agrandissement sur repousses de foin.
- W** **Produit à action rémanente** : un traitement à la mi-août des vœux femelles de renouvellement maintenus au pâturage en été-automne.
- W** **Produit à libération continue ou périodique** : l'administration d'un bolus est effectuée à la mise à l'herbe.



Déconseillé
traitement des vœux sous la mère à l'entrée en stabulation et à la mise à l'herbe

Parcelles pâturées au printemps, en été sur les parcelles fauchées, avec ou sans agrandissement



Traitements préconisés contre les strongles

- W** **Produit à action immédiate** : un traitement des vœux au sevrage et à la rentrée en stabulation.
- W** **Produit à action rémanente** : un traitement au sevrage des vœux surtout lors du pâturage sans agrandissement.
- W** **Produit à libération continue ou périodique** : au sevrage pour les futurs bœufs et génisses.



Déconseillé
traitement des vœux sous la mère à l'entrée en stabulation et à la mise à l'herbe

Pâturage de broutards nés en hiver

Sur plusieurs parcelles au printemps, avec ou sans agrandissement de la surface forragère en été-automne



Traitements préconisés contre les strongles

- W** **Produit à action immédiate** : un traitement au sevrage.
- W** **Produit à action rémanente** : le traitement est pratiqué 1 à 1,5 mois avant le sevrage.



Déconseillé
traitement des vœux sous la mère durant le printemps et en début d'été